



Схема диспансеризации и применения глазных капель после операции **FEMTOLASIK**

1

Обязательный врачебный осмотр на следующий день после операции, далее по назначению лечащего врача.

2

Применение глазных капель

Тобрекс + Дексаметазон — в день операции
каждые **2 часа** весь период бодрствования, по **1–2 капли**.

+ Увлажняющие капли «Слезин» («Стиллавит интенсив»).

СОБЛЮДАЙТЕ СХЕМУ — ЭТО ВАЖНО

Точное следование расписанию — залог быстрого и спокойного
восстановления.





Со второго дня после операции

	1 неделя	5 дней	5 дней	5 дней
Тобрекс	1–2 капли 4 раза в день	—	—	—
Дексаметазон	1–2 капли 4 раза в день	1–2 капли 3 раза в день	1–2 капли 2 раза в день	1–2 капли 1 раз в день
Увлажняющие капли	1 капля 4 раза в день	1 капля 4 раза в день	1 капля 4 раза в день	1 капля 4 раза в день

Внимание!

Строго соблюдайте режим закапывания капель — это очень важно для профилактики инфекционных осложнений и воспаления.

- * Перед закапыванием **обязательно вымойте руки.**
- * Все капли закапываются в глаз с интервалом между лекарствами **3–5 минут.**
- * Замена препаратов при отсутствии в аптеке возможна **только после консультации с лечащим врачом.**

